

KASR TARTIBLI DIFFUZIYA TENGLAMASI FUNDAMENTAL YECHIMI

Abdullayev Erkinjon Toxirovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasr tartibli diffuziya tenglamasi fundamental yechimi kasr tartibli differensial tenglama uchun Koshi masalasi yechimi yordamida yechish masalasi hamda bu yechimning klassik yechim bo'lish masalasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Kasr tartibli diffuziya tenglamasi, Koshi masalasi, Kaputo ma'nosidagi kasr tartibli hosila, Mittag-Leffler funksiyasi, Dirakning delta funksiyasi.

KIRISH

Hozirgi zamon matematikasida yangi yo'naliш hisoblangan kasr tartibli hosila, kasr tartibli integral va kasr tartibli differensial tenglamalarni o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Bu mavzuda dunyo olimlari hozirgi kunda juda ko'p izlanishlar olib borishmoqda. Xususan respublikamizda "Romanovskiy" nomidagi matematika instituti Buxoro filialida ustozimiz prof.D.Q.Durdiyev rahbarligida bu mavzu keng o'rganilib kelmoqda.

Ushbu maqolada kasr tartibli differensial tenglamaning kasr tartibli diffuziya tenglamasini yechishdagi tadbipi nazariy jihatdan o'rganilgan.

Masalaning qo'yilishi: Bizga bir jinsli bo'limgan kasr tartibli diffuziya tenglamasi berilgan va bu differensial tenglamani kasr tartibli differensial tenglama uchun Koshi masalasi yordamida yechish masalasi qo'yilgan.

$$\begin{cases} {}^K D_{0+t}^{\alpha} y(x) + \lambda y(x) = f(x) & x \in R, t > 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad (1) \rightarrow \text{Koshi masalasi.}[3]$$

$$y(x) = y_0 E_{\alpha}(-\lambda x^{\alpha}) + \int_0^x y^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda y^{\alpha}) f(x-y) dy \quad (2) \rightarrow \text{Koshi masalasi yechimi.}[3]$$

Kasr tartibli diffuziya tenglamasining fundamental yechimini Koshining (1)masalasi yechimi yordamida keltirib chiqaramiz.

Quyidagi masala qo'yilgan:

$$\begin{cases} {}^K D_{0+t}^{\alpha} U(x,t) - U_{xx} = f(x,t) & x \in R, t > 0 \\ U(x,0) = \varphi(x) \end{cases} \quad (3)$$

(3)Tenglamaning yechimini topishda Fur'e integral almashtirishlaridan foydalanamiz.[1]

f funksiyaning R dagi Fur'e almashtirishi:

$$F[f] = F[f(x)](\zeta) = \widehat{f}(\zeta) := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix\zeta} f(x) dx, \zeta \in R \quad \text{ko'rinishida bo'ladi.}$$

Kaputo ma'nosidagi kasr tartibli hosila uchun Fur'e integral almashtirishini qo'llaymiz:

$$F[{}^K D_{0+t}^{\alpha} U] = {}^K D_{0+t}^{\alpha} \widehat{U}$$

U_{xx} ni ham Fur'e integral almashtirishi orqali ifodalaymiz:

$$\begin{aligned} F[U_{xx}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixz} U_{xx} dx = \int_{-\infty}^{-\infty} e^{-ixz} d(U_x) = \\ &= e^{-ixz} U_x|_{-\infty}^{\infty} + zi \int_{-\infty}^{-\infty} e^{-ixz} U_x dx = 0 + zi \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixz} dU = zi(e^{ixz} U|_{-\infty}^{\infty} + \\ &+ zi \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixz} U d_x) = zi(0 + i z \hat{U}) = -z^2 \hat{U} \end{aligned}$$

(Bu yechimga kelishda $\int u dv = uv - \int v du$ bo'laklab integrallash formulasidan, $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (U_x; U) = 0$ tengliklaridan foydalandik.)

$$F[f(x, t)](\zeta) = \hat{f}(\zeta, t)$$

Hosil bo'lgan ifodalarni (3) tenglamaga qo'ysak, bu tenglik quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\begin{cases} {}^K D_{0+t}^{\alpha} \hat{U} + z^2 \hat{U} = \hat{f}(\zeta, t) & \zeta \in R, t > 0 \\ \hat{U}(\zeta, 0) = \hat{\varphi}(\zeta) \end{cases} \quad (4)$$

Tenglamaning bu ko'rinishi Koshining (1) masalasiga mos keladi: $\begin{cases} {}^K D_{0+t}^{\alpha} y(x) + \lambda y(x) = f(x) & x \in R, t > 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$

(3) tenglamaning yechimini topish uchun Koshining (1) masalasi yechimidan foydalanamiz.

$y(x) = y_0 E_{\alpha}(-\lambda x^{\alpha}) + \int_0^x y^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda y^{\alpha}) f(x-y) dy$ ifoda (1) tenglama yechimi hisoblanadi.

Bunga ko'ra tenglama yechimini keltiramiz:

$$\hat{U}(\zeta; t) = E_{\alpha}(-z^2 t^{\alpha}) + \int_0^t y^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-z^2 y^{\alpha}) \hat{f}(\zeta; t-y) dy \quad (5)$$

$$\text{Bu tenglikka ko'ra } \begin{cases} {}^K D_{0+t}^{\alpha} U(x, t) - U_{xx} = f(x, t) & x \in R, t > 0 \\ U(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad (3)$$

(3)tenglama yechimiga erishish uchun teskari Furye almashtirishidan foydalanamiz.

$f(x)$ funksianing teskari Furye almashtirishi quyidagi integralga aytildi:

$$F^{-1}[f] = F^{-1}[f(x)](\zeta) = \frac{1}{2\pi} \int_R e^{ixz} f(z) dz$$

$$\text{Demak: } U = F^{-1}[\hat{U}] = \frac{1}{2\pi} \int_R e^{ixz} \hat{U}(z; t) dz \quad (6)$$

(6)tenglikdagi \hat{U} ning o'rniga (5)ifodani qo'ysak (7)ko'rinishidagi kasr tartibli diffuziya tenglamasining fundamental yechimiga ega bo'lamiz:

$$U(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_R e^{ixz} \left[E_{\alpha}(-z^2 t^{\alpha}) + \int_0^t y^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-z^2 y^{\alpha}) \hat{f}(z; t-y) dy \right] dz \quad (7)$$

(7)tenglik (3) tenglamaning yechimi hisoblanadi.

Bu yechimning quyidagi (8)masala uchun o'rinni bo'lismeni ko'rib chiqamiz:

$$\begin{cases} {}^K D_{0+t}^{\alpha} U(x, t) - U_{xx} = f(x, t) & x \in R, t > 0 \\ U(x, 0) = \delta(x) \end{cases} \quad (8)$$

Bu yerda $\delta(x)$ Dirakning delta funksiyasi:

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} +\infty, & x = x_0 \\ 0, & x \neq x_0 \end{cases}$$

$$\int_R \delta(x - x_0) dx = 1, \quad \forall y \in D(R) = C_0^{\infty}(R)$$

$$\int_R \delta(x - x_0) \varphi(x) dx = \varphi(x_0) \quad (9)$$

$$\delta(x) = \delta(-x) \text{ (juft funksiya)}$$

(7) tenglik bo'yicha $U(x, 0)$ ni topamiz:

$$U(x, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_R e^{ixz} \left[E_\alpha(-z^2 t^\alpha) + \int_0^0 y^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-z^2 y^\alpha) \hat{f}(z; 0-y) dy \right] dz =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_R e^{ixz} dz = \delta(x)$$

$$(bu natija \int_0^0 y^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-z^2 y^\alpha) \hat{f}(z; 0-y) dy = 0,$$

$$E_\alpha(-z^2 t^\alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-z^2 t^\alpha)^n}{\Gamma(\alpha n + 1)} \text{ ifodalarga ko'ra kelib chiqdi}$$

(9) formulaga ko'ra (7) tenglik bilan ifodalangan yechimning (8) ko'rinishidagi masala uchun o'rinali ekanligi kelib chiqadi:

$$U(x, 0) = \int_R \varphi(y) \left[\frac{1}{2\pi} \int_R e^{iz(x-y)} dz \right] dy = \int_R \varphi(y) \delta(x-y) dy = \varphi(x)$$

Bunga ko'ra

$$\begin{cases} {}^K D_{0+t}^\alpha U(x, t) - U_{xx} = f(x, t) & x \in R, t > 0 \\ U(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad (3)$$

tenglamaning

$$U(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_R e^{ixz} \left[E_\alpha(-z^2 t^\alpha) + \int_0^t y^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-z^2 y^\alpha) \hat{f}(z; t-y) dy \right] dz \quad (7)$$

yechimi klassik yechim bo'lishi kelib chiqadi. Demak, tenglamaning bu yechimidan boshqa shu tipdagi fizika-matematika tenglamlari yechishda foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. С.Г.Самко, А.А.Килбас, О.И.Маричев «Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения» Минск «Наука и техника» 1987. 688 стр
2. Адамар.Ж. «задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа». Москва. «Наука». 1978, 352 стр,
3. “Bir jinsli bo’limgan kasr tartibli differential tenglama uchun Koshi masalasi” maqola. M.B.Mamadiyorov. 3 sahifa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6589912>