

## ФОСФАТЛИ ХОМАШЁЛАРНИНГ ГЕОЛОГИК ВА МИНЕРАЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳасанова Азиза Абдурашид қизи  
2-курс талабаси,  
Наманган мұхандислик-технология институты.  
E-mail:hasanovaaziza1102@gmail.com  
Тел:+998978431102

**Аннотация:** Ушбу мақолада фосфорит хомашёси, фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш, юқори техник-иктисодий күрсаткичларга эга бўлган фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш ҳақидаги маълумотлар баён этилган.

**Калит сўзлар:** фосфатли хомашёлар ,фосфорит, азот, фосфор, калий, паст навли рудалар, фосфатли рудалар, АҚШ, Марокаш, Хитой, Россия, Мексика, Қозоғистон, Перу, Жанубий Африка, карбонатли жинслар, техник-иктисодий күрсаткичлар.

Дунёда ишлаб чиқарилаётган фосфорли ўғитлар апатит ва фосфорит концентратлари асосида олинади, уларнинг заҳираси эса йилдан-йилга камайиб бормоқда, ишлаб чиқаришга паст навли, жумладан юқори карбонатли хомашёларни қамраб олиб, улардан фойдаланган ҳолда таркибида кальций ва олtingугурт бўлган фосфорли ўғитлар олиш бўйича илмий- тадқиқот ишлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунга келиб дунё миқёсида фосфатли хомашёлар сарфи йилига 190 млн тоннага ёки Р2О5 бўйича 43 млн тоннага ортганилигини кўриш мумкин. Башоратларга кўра, фосфатли хомашёлар истеъмоли 2030 йилгача бўлган даврда йилига 2 млн тоннага ошиши кутилмоқда. 2050 йилга бориб йиллик фосфатли хомашёнинг истеъмоли 220 млн тоннага ёки Р2О5 бўйича тахминан 70 млн тоннага етади.

Ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб ўғитлар истеъмолининг ўсиши билан паст навли рудаларни бойитиш үсулларини такомиллаштириш, асосий компонентлар миқдорини ошириш мақсадида бегона қўшимчалардан иложи борича тозалаш ҳамда қайта ишлашга яроқли ҳолга келтириш борасидаги эҳтиёж катта бўлди.

БМТнинг маълумотларига кўра, ер юзи аҳолисининг сони 1970 йилдаги 3,7 миллиарддан 2021 йилга келиб 7,8 миллиардга ошди, 2075 йилда эса 15 миллиарддан ошиши тахмин қилинмоқда. Энг катта ўсиш Осиё қитъаси ҳиссасига тўғри келади. Аҳолининг кўпайиши муносабати билан айниқса озиқ-овқат ва техник экинларни ривожлантириш муаммоси кескин бўлиб қолмоқда. Бундай муаммолар ечимини юқори сифатли минерал ўғитлар ишлаб чиқариш хомашё базасини кенгайтириш, ишлаб чиқариш технологияларини жадаллаштириш орқали ҳал этилиши мумкин.

Бутун дунёда ўғитларга бўлган талаб аҳоли сонининг ўсишига мутаносиб равишда ошиб бормоқда. XXI асрнинг биринчи ўн йиллигининг охирига келиб,

фосфатли хомашёнинг йиллик истеъмоли 166 млн тоннага етди. Бунинг натижасида фосфатли хомашё қазиб чиқарилиши кўпаймоқда. Фосфатли рудаларнинг жаҳондаги заҳиралари жуда катта бўлишига қарамай, улар тугаган ресурслар ва фосфорнинг табиий циклида табиий ҳолатда қайтишида унинг истеъмолини қоплай олмайди. Шу билан бирга, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўсиши қишлоқ хўжалигига ўғитларсиз ишлов бериш мумкин бўлмаган янги ерларни қамраб олишни талаб қиласди, шунинг учун аҳоли ўсишига қараганда фосфатли хомашё истеъмоли кескин ошиб кетиши мумкин.

Жаҳон миқёсидаги фосфатли рудаларнинг аниқланган заҳиралари 60 дан ортиқ мамлакатлар ҳиссасига тўғри келади, улар Р2О5 ҳисобида 70,6 млрд тоннани ташкил этади, шундан 65,3 млрд тоннаси фосфорит ва 5,3 млрд тоннаси апатит рудаларига тўғри келади. Бутун жаҳондаги заҳиранинг 87% миқдори 10 мамлакатда – АҚШ, Марокаш, Хитой, Россия, Мексика, Қозоғистон, Перу, Жанубий Африка, Ғарбий Сахара ва Тунисда жамлангандир. Турли мамлакатлар томонидан қазиб олинадиган фосфатли хомашёлардаги Р2О5 миқдори 21 дан 38,2% гача чегарада ўзгаради. Энг яхши фосфатли хомашё Россиядаги Хибин апатит концентрати ҳисобланади. Жаҳонда фосфатли рудаларнинг фақат бешта асосий манбалари мавжуд бўлиб, уларга: 1) денгиз чўкинди захиралари, 2) магматик захиралар, 3) метаморфик захиралар, 4) биоген конлар, 5) атроф-муҳит таъмири натижасида ҳосил бўлган фосфат захиралари киради.

Пайдо бўлиши бўйича магматик ва чўкинди фосфатлари бўлиши мумкин. Апатит (магматик жинс) вулқон лавасини бевосита қотиши (пегматит тармоқлари) ёки иссиқ сувли эритмалардан (гидротермал ҳосилалардан) ажралиши ёхуд лаванинг оҳактош каби карбонатли жинслар билан ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўлади. Шунинг учун ҳам апатит жинслари кристалл ҳолатдаги донадор тузилишга эга бўлиб, полидисперслиги ва микроовакларнинг йўқлиги билан тавсифланади.

Ҳар иккала хомашё турида ҳам фосфат моддаси 3Ме3(РО4)2•СаХ2 умумий формулага эга бўлган апатит гуруҳидаги минераллар бўлиб, бу ерда Са<sup>2+</sup> ни Ме билан, фтор, хлор ва ОН гуруҳини X билан ифодаланган. Кальцийфторапатит 3Са3(РО4)2•СаF2 ёки Са5(РО4)3F, шунингдек гидроксилапатит 3Са3(РО4)2•Са(OH)2 ёки Са5(РО4)3ОН табиатда энг кўп тарқалгандир.

Апатит рудаларида, апатитдан ташқари қуйидаги минераллар: натрий ва алюминий силикатлари – нефелин (Na, K)AlSiO4•nSiO2, натрий ва темир силикатлари – эгирин NaFe(SiO3)2 ва бошқалар, титаномагнетит Fe3O4•FeTiO3•TiO2, ильменит FeTiO3, сfen CaTiSiO5, дала шпатлари, қора слюдалар, эвдалитлар бўлади. Фосфоритли рудалар таркибига қуйидаги минераллар ва қўшимчалар: глауконит – сувли силикат туридаги [(R2O+RO)•R2O3•4SiO2•2H2O], бу ерда R2O – Na2O ва K2O, RO – MgO, лимонит Fe2(OH)6•Fe2O3, кальцит CaCO3, доломит CaCO3•MgCO3, магний

силикатлари  $Mg_2SiO_4$ , каолин  $Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 2H_2O$ , пирит  $FeS_2$ , дала шпати, кварц, гранит ҳамда органик моддалар киради.

Дунёдаги энг йирик фосфатлар ишлаб чиқарувчиларидан бири – бу флотацияли апатит концентрати ишлаб чиқарадиган Россия Федерациисининг «Апатит» АЖ ҳисобланади. «Апатит» АЖнинг руда заҳираси Хибин ишқорий ҳудудида жойлашган апатит-нефелин руда конлари ҳисобланади.

Шимолий Африка дунёдаги энг йирик фосфорит заҳираларига эга бўлиб, улар денгиз чўкинди конлари кўринишида бўлади. Марокаш мамлакати фосфатли хомашё ишлаб чиқариш бўйича дунёда учинчи ўринни ва экспорт қилиш бўйича эса биринчи ўринни эгаллайди.

Хитойда рудаларга энг бой Кунян кони (Юньман вилоятининг пойтахти Куньмин шаҳридан 38 км) ҳисобланади. Хитой фосфатли хомашё ишлаб чиқариш бўйича дунёда тўртинчи, уни истеъмол қилиш бўйича эса учинчи ўринни эгаллайди. Хитойда фосфатли хомашёни қазиб олиш учун 180 дан ортиқ кон саноати қурилган. Фосфоритлар таркибидаги  $P_2O_5$  миқдори 20-32% бўлиб, карбонатли ёки силикат-карбонатли ҳисобланади.

Марказий Осиё мамлакатларининг фосфат саноати Қоратоғ (Қозоғистон Республикаси) ва Марказий Қизилқум (Ўзбекистон Республикаси) фосфоритларига асосланган.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида геологик қидирув ишлари натижасида Марказий Қизилқум (МҚ) ҳавзасида донадор фосфоритларнинг энг йирик кони топилган бўлиб, бу ерда ўрта эоцен чўкинди жинсларининг энг истиқболли ўн иккита майдони мавжуддир. Қизилқум фосфоритларининг физик-кимёвий хусусиятлари жиҳатидан ўхшаши йўқ, аммо мезозой формацияси карбонатли гуруҳларига хос Шимолий Африка, Яқин Шарқ ва Афғонистон конларининг фосфоритларига ўхшайди.

Ўзбекистон ҳам Россия ва Қозоғистон каби фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш учун ўзининг фосфатли хомашё базасига эгадир. Фосфорит конлари Ўзбекистоннинг кўпгина (Марказий Қизилқум, Сурхондарё, Қорақалпоғистон, Фарғона ва бошқа) минтақаларида мавжуд. Улардан саноатда ўзлаштирилиши нуқтаи назардан Марказий Қизилқум (МҚ) ҳудудидаги фосфорит конлари энг истиқболли ҳисобланади. Бугунги кунга келиб Марказий Қизилқум ҳудудида кўп сондаги фосфорит конлари ва донадор фосфоритларнинг тўртта (Етимтоғ, Жер-Сардор, Тошқўра ва Қорақат) кони аниқланган бўлиб, улар ҳиссасига ҳудуддаги истиқболли фосфат ( $P_2O_5$ ) ресурсларининг 50% дан ортиғи тўғри келади.

Марказий Қизилқумнинг фосфоритли ҳавзаси 65 минг км<sup>2</sup> га яқин майдонни қамраб олган. Агар саноат фосфорити таркибли бу майдоннинг атиги 5% ини қамраб олган деб ҳисобласак, ўртacha қатламлар умумий қалинлигини 2,5 метр бўлган фосфоритларнинг башорат қилинган заҳираси 16,25 млрд тонна ёки  $P_2O_5$  ҳисобида 1,95 млрд тоннани ( $P_2O_5$  нинг ўртacha миқдори – 12%) ташкил қиласи. Қизилқумнинг

3000 км<sup>2</sup> майдонида мергел донадор фосфорит рудалари аниқланган ва батафсил ўрганилган. Фосфоритларнинг 300 м чуқурликкача бўлган ресурслари 10 млрд тоннани (бу тахминан 2 млрд тонна Р2О5), шу жумладан очиқ кончилик учун мавжуд бўлган (60 метргача) чуқурлиқда 1,0-1,2 млрд тонна рудани (ёки 200-240 млн тонна Р2О5 ни) ташкил этади.

Шимолий Етимтоғ кони Томди туманида, Томдибулоқ шаҳарчасидан 75-80 км шимолий-шарқий томонида жойлашган. Заҳираси 50 млн тонна миқдордаги руда (10 млн тоннадан ортиқ Р2О5) эканлиги тасдиқланган, руда таркибида ўртacha 20,25% Р2О5 бўлади. Хомашё технологик хоссалари жиҳатидан Жер-Сардор конидаги хомашёга ўхшайди. Коннинг шарқий ва жанубий-шарқий қисмида 50 метр чуқурликкача С2 туркумдаги донадор фосфоритлари рудасининг заҳираси 142 млн тоннани (ёки таркибида 19,8-22,7% Р2О5 бўлганда 28 млн тоннадан ортиқ Р2О5 ни) ташкил этади.

Қорақат кони Мурунтоғ қишлоғидан 55 км жанубий-шарқда, Конимех туманида жойлашган. Кон иккита: Азтек ва Аяққудук участкаларидан иборатдир. Башорат манбаларига кўра, Қорақат конининг Азтек қисмидаги руда 27 млн тонна (ёки таркибида 18,29% Р2О5 бўлса, 4,9 млн тонна Р2О5) ва Аяккудук бўлимидаги руда 16 млн тонна (ёки таркибида 20,54% Р2О5 бўлса, 3,3 млн тонна Р2О5) бўлиши баҳоланади.

Марказий Қизилқум фосфоритларининг физик-кимёвий тавсифи замонавий усуллардан фойдаланган ҳолда батафсил ўрганилган.

Келтирилган маълумотлардан кўринадики, фосфорит хомашёси фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш жараёнигача кўп босқичли жараёнлардан ўтади. Бундан ташқари, бундай хомашёлар ҳам бошқа норуда хомашёлари каби чегараланган заҳирага эгадир. Шунинг учун фосфоритлардан олинган ярим маҳсулот ЭФК ни ноанъанавий усулларда қайта ишлаз орқали концентранган, юқори техник-иктисодий кўрсаткичларга эга бўлган фосфорли ўғитлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.

### **ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:**

1.Арисланов А.С. Разработка технологии получения кальций-содержащих азотно-фосфорных удобрений с водорастворимой формой сульфатов из фосфоритов Карагат и Центральных Кызылкумов. Дисс. ... канд. техн.наук. – Наманган- 2022. – 127с.

2.Гафуров К., Шамшидинов И.Т., Арисланов А.С. Сернокислотная переработка высокомагнезиальных фосфатов и получение NPS-удобрений на их основе // Монография.– Наманган: Издательство «Истеъдод зиё пресс», 2020. – 136 с.

- 3.Арисланов, А., Гафуров, К., & Тураев, З. (2009). Изучение состава и термообогащения рядовых руд Кызылкума. Международный журнал «Наука Образование Техника».—Ош, 1(2), 29-31.
- 4.Shamshidinov, I., Arislanov, A., & Isomiddinov, O. (2022). ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНОГО ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ ТИПА ДВОЙНОГО СУПЕРФОСФАТА. Science and innovation, 1(A5), 198-205.
- 5.Арисланов, А., Тураев, З., & Гафуров, К. (2009). Получение сложного фосфорного удобрения типа двойного суперфосфата. Международный журнал «Наука Образование Техника».—Ош, 1(2), 31-32.
6. Shamshidinov, I. (2022). STUDY OF THE PROCESS OF DECOMPOSITION OF TRICALCIUM PHOSPHATE BY PHOSPHORIC ACID WITH PARTIAL REPLACEMENT OF  $\text{H}_2\text{SO}_4$  BY SULFURIC ACID IN THE PRESENCE OF AMMONIUM NITRATE. NeuroQuantology, 20(12), 3345.
- 7.Арисланов, А. С., Шамшидинов, И. Т., Хусанова, М. Н., & Усманова, З. Ш. (2021). Удаления фтора в процессе экстракции фосфорной кислоты. Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах), (2), 20-24.
8. Арисланов, А., Режаббаев, М., Солиев, М., & Абдураззакова, М. (2018). ОБЕСФТОРИВАНИЕ ЭФК В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ЭКСТРАКЦИИ. Редакция научного электронного журнала «Академическая публицистика»: ru | E-mail: info@ aeterna-ufa.ru Верстка/корректура: Зырянова МА Подписано для публикации на сайте 04.06.2018 г., 25.
- 9.Арисланов, А. С. ПАХТА Х. ОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА УРУГЛИК ЧИГИТЛАРНИ МИНЕРАЛ УГИТЛАР БИЛАН<sup>+</sup> ОБЩЛАШ ВА ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ ФАОЛЛАШГАН СУВ БИЛАН ИВИТИБ ЭКИШ, 43.
10. Мамадалиев, А. Т., Мамаджонов, З. Н., Арисланов, А. С., & Исомиддинов, О. Н. (2022). Қишлоқ хұжалигіда уруғлик чигитларни азот фосфорлы үғитлар билан қобиқлаш. Science and UIF-2022, 8.
11. Арисланов, А. С., Шамшидинов, И. Т., Мамаджонов, З. Н., & Мухиддинов, Д. Х. (2020). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ ИЗ МЕСТНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ. In ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (pp. 12-14).
12. Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., & Арисланов, А. С. (2020). Сернокислотная переработка высокомагнезиальных фосфатов и получение NPS-удобрений на их основе. Наманган: Издательство «Истеъдод зиё пресс.
- 13.Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., & Арисланов, А. С. (2020). Сернокислотная переработка фосфоритов Карагатай и сложных удобрений на их основе. Монография. Издательство Lap Lambert Academic Publishing.

14. Gafurov, K., Shamshidinov, I. T., & Arislanov, A. S. (2020). Sulfuric acid processing of high-magnesium phosphates and obtaining NPS-fertilizers based on them. Monograph. Publishing house "Istedodziyo press" Namangan, 26-27.
15. Арисланов, А. С., Шамшидинов, И. Т., Мамаджонов, З. Н., & Рустамов, И. Т. (2020). Способ получения сульфата алюминия из местных бентонитов. In International scientific review of the problems of natural sciences and medicine (pp. 11-17).
- 16.Шамшидинов, И. Т., Мамаджанов, З. Н., Арисланов, А. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ. Universum: технические науки, (4-6 (109)), 17-23.
- 17.Гафуров, К. (2005). Шамшидинов. ИТ, Арисланов АС Обесфторивание экстракционной фосфорной кислоты в процессе ее экстракции.«. Вестник ФерПИ», Фергана, (1).
18. Шамшидинов, И., Арисланов, А., & Гафуров, К. (2005). Комплексные удобрения на основе фосфорноазотнокислотной переработки фосфоритов Карагатай/Шамшидинов И. Узб. хим. журнал, (2), 45-49.
19. Гафуров, К., Арисланов, А., & Шамшидинов, И. (2004). Снижение фтористых соединений в фосфогипсе. Научно-технический журнал ФерПИ.–Фергана, 3, 63-66.
- 20.Шамшидинов, И. Т., & Арисланов, А. С. (2022). Влияние магния на процесс экстракции фосфорной кислоты. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(6), 485-491.
- 21.Sayubbaevich, A. A., Turgunovich, S. I., & Karimovich, E. O. (2019). Phosphoric Acid Decomposition of Phosphorite with Partial Replacement of Its Sulfuric Acid. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 6(8), 10473-10475.
- 22.Гафуров, К., Шамшиддинов, И. Т., Арисланов, А. С., & Ботиров, Ш. Капсулирование семян. Журнал "Хлопок". Ш. Москва-1992.
- 23.Mamadaliev, A., Mamadjonov, Z., Arislanov, A., & Isomiddinov, O. (2022). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ АЗОТ ФОСФОРЛИ ЎҒИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛАШ. Science and innovation, 1(D5), 180-189.
24. Turgunovich, S. I., Sayibbaevich, A. A., & Najmuddinog'li, I. O. (2022). Removal of Fluorine during the Extraction of Phosphoric Acid. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 258-267.
25. Sayubbaevich, A. A., Turgunovich, S., & Ikramovich, U. I. (2021). Thermodynamic justification for the production of sulfurcontaining nitrogen-phosphorus fertilizers. Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology, 6(2), 77-81.
26. Шамшидинов, И. Т., Мамаджонов, З. Н., & Мухиддинов, Д. Х. (2020). Наманганский инженерно-технологический институт, г. Наманган, Узбекистан. Инновационные исследования: теоретические основы и практическое, 12.

- 27.Sayubbaevich, A. A., Turgunovich, S. I., & Karimovich, E. O. (2019). Phosphoric Acid Decomposition of Phosphorite with Partial Replacement of Its Sulfuric Acid. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 6(8), 10473-10475.
- 28.Arislanov, A. S., Rezhabbaev, M., Soliev, M., & Abdurazzakova, M. (2018). Defluorination of EPA during its extraction. Scientific electronic journal" Academic journalism". Ufa: Aeterna, Russia, 25.
29. Арисланов, А. С., Журабоев, Ф. М., Аманов, А. К., & Каримов, А. И. (2016). Комбинированная технология производства серосодержащего азотно-фосфорного удобрения. In Современные тенденции развития аграрного комплекса (pp. 260-262).
30. Мамадалиев, А. Т., Мамаджонов, З. Н., Арисланов, А. С., & Исомиддинов, О. Н. (2022). Қишлоқ хұжалигіда уруғлик чигитларни азот фосфорлы үғитлар билан қобиқлаш. Science and UIF-2022, 8.
31. No, P. (1998). 5698 UZ. Method of obtaining extraction phosphoric acid/Gafurov K., Shamshidinov IT, Arislanov A., Mamadaliev A.(UZ).
32. Гафуров, К., Абдуллаев, М., Мамадалиев, А., Мамаджанов, З., & Арисланов, А. (2022). Уруғлик чигитларни макро ва микроүғитлар билан қобиқлаш.
- 33..Arislanov, A., Shamshidinov, I., & Gafurov, K. (2006). Defluorination of EPA from phosphorites of KyzylKum in the process of decomposition. Scientific and technical journal FerPl.-Fergana: FerPl, (2), 95-98.
34. Шамшидинов, И. Т., & Арисланов, А. С. ОБЕСФТОРИВАНИЕ ЭФК ИЗ ФОСФОРИТОВ КЫЗЫЛКУМ В ПРОЦЕССЕ РАЗЛОЖЕНИЯ.
35. Гафуров, К. (2005). Шамшидинов. ИТ, Арисланов АС Обесфторивание.
- 36.Арисланов, А. С., Шамшидинов, И. Т., & Гафуров, К. (2005). Кальцийсодержащие азотно-фосфорные удобрения с растворимыми сульфатами. Узбекский химический журнал, (4), 9-13.
37. Gafurov, K. (2005). Shamshidinov. IT, ArislanovA. S. Defluorination of extraction phosphoric acid during its extraction." VestnikFerPl", Fergana,(1).
- 38.Gafurov, K., Arislanov, A.,& Shamshidinov, I. (2004). Reduction of fluoride compounds in phosphogypsum. Scientific and technical journal FerPl. Fergana,(3), 63
39. Arislanov, A., Abdullaev, M., Mamadaliev, A., Mamadjonov, Z., & Isomiddinov, O. (2022). Пахта ҳосилдорлигини оширишда уруғлик чигитларни минерал үғитлар билан қобиқлаш ва электрокимёвий фаоллашган сув билан ивитиб экиш. Science and innovation, 1(D5), 171-179.
40. Arislanov, A., Abdullaev, M., Mamadaliev, A., Mamadjonov, Z., & Isomiddinov, O. (2022). COATING SEEDS WITH MINERAL FERTILIZERS AND SOAKING WITH

ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER IN INCREASING COTTON YIELD. Science and Innovation, 1(5), 171-179.

41. Гафуров, К., Мамадалиев, А. Т., Мамаджанов, З. Н., & Арисланов, А. С. (2022). Комплекс минерал озүқаларни хўжаликлар шароитида тайёрлаш ва қишлоқ хўжалиги уруғларини макро ва микро ўғитлар билан қобиқлаш.

42. Шамшидинов, И., Арисланов, А., & Абдуллаев, Г. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА СМЕСЬЮ ТЕРМИЧЕСКОЙ ФОСФОРНОЙ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 440-445.

43. Arislanov, A., Abdullaev, M., Abdilalimov, O., & Isomiddinov, O. (2022). THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE AMOUNT OF NUTRIENTS IN THE SOIL. Science and Innovation, 1(8), 334-340.

44. Шамшидинов, И. Т., Арисланов, А. С., & угли Исомиддинов, О. Н. (2022). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННАЯ ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА ИЗ ФОСФОРИТОВ КЫЗЫЛКУМА. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 20-26.

45. Arislanov, A., Abdullaev, M., Abdilalimov, O., & Isomiddinov, O. (2022). МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТУПРОҚДАГИ ОЗУҚА МОДДАЛАР МИҚДОРИГА ТАЪСИРИ. Science and innovation, 1(D8), 334-340.

46. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Қодирова, Г. К., Арисланов, А. С., & Турсунов, Л. А. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КАЛЬЦИЙ-И МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ. In Инновации в сельскохозяйственном машиностроении, энергосберегающие технологии и повышение эффективности использования ресурсов (pp. 439-442).

47. K Gafurov,, Shamshidinov. IT, Arislanov AS Research and development of obtaining complex defluorinated fertilizers from phosphorites of Karatau. Research report on the state budget, state register. 0017867

48. Гафуров К. Шамшидинов И. Арисланов А. Ботиров Ш. Пахта чигитини қобиқлаш усули билан минерал ўғитларнинг фойдали таъсир коэффициентини ошириш. Наманган саноат-технология институти профессор-муаллимлари илмий-амалий конференциясининг маъruzалар матни, Наманган ш., 1991. 65-б.

49. Арисланов А. Шамшидинов И., Гафуров К. Фосфорно- азотокислотное разложение фосфоритов Караганда и удобрений на его основе.

«Илмий-техника» журнали, ФарПИ, 2000й, №1.90-936

50. Акмалжон Сайиббаевич Арисланов, Олимжон Кутбидинович Нуридинов. Сернокислотное разложение бентонитовых глин. НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, 2018

- 51.Арисланов А. С. Шамшидинов И. Т. Комбинированная технология производства серосодержащего азотно-фосфорного удобрения. Ўзбекистон Композицион материаллар илмий техникавий ва амалий журнали,2018й
- 52.Т.Ботиров И.Шамшидинов., А.Арисланов. Фосфорно-азотнокислотное разложение фосфоритов Караганда. Самарқанд давлат университетида илмий ахборотномаси,2018й,№1.1046
- 53.Арисланов Акмалжон Сайиббаевич. Обесфторивание эфк из фосфоритов Кызылкум в процессе разложения. Наманган мұхандислик-технология институти илмий-техника журнали.2021й,324-328
- 54.Арисланов Акмалжон Сайиббаевич,Получение экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Кызылкума. Наманган мұхандислик-технология институти илмий-техника журнали. №1. 328-333
- 55.Арисланов Акмалжон Сайиббаевич.Қоратоғ ва Марказий Қизилқұм фосфоритларидан сувда әрувчан сульфатли кальцийли азот-фосфорли үғитлар технологиясини ишлаб чиқиш. Наманган мұхандислик-технология институти илмий-техника журнали. №2.
56. Арисланов А. С. Курбанов Н.М., Астанақулов К. Д. Монография. Озуқали донларни поғонали майдалаш қурилмаси ва унинг техник-иқтисодий күрсаткичлари.2023. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscribtum S.R.L Publishing group. Republic of Moldova, Europe
57. Құрбонов Н. М. Арисланов А.С., Солиев М.И. Монография.Эфир мойларининг табиий манбалари. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscribtum S.R.L Publishing group. Republic of Moldova, Europe.
58. Шамшидинов И.ТМамаджонов З.Н., Арисланов А. С. , Мамадалиев А.Т.Способ получения жидких комплексных удобрений из промышленных отходов. 2023. 4(109)
- URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15280>
- 59.Шамшидинов И.Т.,Мамаджонов З.Н., Арисланов А. С. , Мамадалиев А.Т . СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ. Экономика и социум, №10(113) 2023.
60. Shamshidinov Israiljon Turgunovich, Arislanov Akmaljon Sayibbaevich.Acid Decomposition of Bentonite Clay in Uzbekistan. European Multidisciplinary Journal of Modern Science. 2022/5/5.268-275
- 61.Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., Арисланов, А., & Мамадалиев, А. Т. (1998). Способ получения экстракционной фосфорной кислоты. SU Patent, 5213, 20.