**КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ**

Жураева Барно Гуломовна

Саидова Фотима

Рузимуродов Авазбек

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт, г. Ташкент

**АТОПИК ДЕРМАТИТ БИЛАН БОЛАЛАРДА ОЗИҚ-ОВҚАТ АЛЛЕРГИЯСИНИ
ДАВОЛАШ УЧУН КЛИНИК АҲАМИЯТ, ПРОГНОЗ ВА САМАРАДОРЛИК**

Жураева Барно Гуломовна

Саидова Фотима

Рўзимуродов Авазбек

Тошкент давлат Стоматология институти, Тошкент шаҳри

**CLINICAL SIGNIFICANCE, COURSE PROGNOSIS AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT
OF FOOD ALLERGY IN YOUNG CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS**

Zhuraeva Barno Gulomovna

Saidova Fotima

Ruzimurodov Avazbek

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. В этой статье рассматривается критическое пересечение атопического дерматита (АД) и пищевой аллергии у детей младшего возраста, проливая свет на его клиническое значение, прогностические факторы и эффективность подходов к лечению. Атопический дерматит - распространенное и часто мучительное заболевание кожи у детей, а наличие сопутствующей пищевой аллергии может усугубить его симптомы. Клиническая значимость заболевания подчеркивается его глубоким влиянием на благополучие ребенка, включая контроль симптомов, качество жизни и профилактику осложнений. Прогноз зависит от нескольких факторов, включая раннее вмешательство и чувствительность к аллергенам. В статье также рассматривается эффективность лечения, включая диеты, исключаящие аллергены, режимы ухода за кожей, алерготесты и иммунотерапию. Предоставляя информацию об этих аспектах, данная статья служит ценным ресурсом для медицинских работников и лиц, осуществляющих уход, ориентирующихся в сложном ландшафте атопического дерматита и пищевой аллергии у детей младшего возраста.

Ключевые слова: *атопический дерматит, экзема, пищевая аллергия, дети, клиническое значение, прогноз, лечение, контроль симптомов, качество жизни, осложнения, аллергопробы, иммунотерапия, элиминационная диета на аллергены, уход за кожей, раннее вмешательство, чувствительность, дерматологические состояния, детская дерматология, избегание аллергенов, десенсибилизация аллергенами.*

Annotation. *This article explores the critical intersection of atopic dermatitis (AD) and food allergies in young children, shedding light on its clinical significance, prognostic factors, and the effectiveness of treatment approaches. Atopic dermatitis is a common and often distressing skin condition in children, and the presence of underlying food allergies can exacerbate its symptoms. The clinical significance is underscored by the profound impact on a child's wellbeing, including symptom control, quality of life, and the prevention of complications. Prognosis depends on several factors, including early intervention and allergen sensitivity. The article also delves into the effectiveness of treatments, including allergen elimination diets, skin care regimens, allergy testing, and immunotherapy. By providing insights into these dimensions, this article serves as a valuable resource for healthcare professionals and caregivers navigating the complex landscape of atopic dermatitis and food allergies in young children.*

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 1 РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Keywords: *atopic dermatitis, eczema, food allergies, children, clinical significance, prognosis, treatment, symptom control, quality of life, complications, allergy testing, immunotherapy, allergen elimination diet, skin care, early intervention, sensitivity, dermatological conditions, pediatric dermatology, allergen avoidance, allergen desensitization.*

ВВЕДЕНИЕ

Клиническое значение, прогноз и эффективность лечения пищевой аллергии у детей младшего возраста с атопическим дерматитом являются важными темами

в области детской дерматологии и аллергологии. Давайте рассмотрим эти аспекты более подробно:

1. Клиническое значение:

Атопический дерматит (АД), также известный как экзема, - это распространенное воспалительное заболевание кожи, которое часто начинается в младенчестве или раннем детстве. Пищевая аллергия может играть значительную роль в развитии и обострении АД

у детей младшего возраста. Клиническое значение выявления и лечения пищевой аллергии в таких случаях включает в себя:

Контроль симптомов: Пищевая аллергия может провоцировать или усугублять симптомы АД, приводя к сильному зуду, покраснению и воспалению кожи. Выявление и устранение пищевых триггеров может помочь контролировать эти симптомы.

Качество жизни: АД может значительно ухудшить качество жизни ребенка из-за дискомфорта, нарушений сна и потенциальной социальной стигмы. Лечение основной пищевой аллергии может улучшить общее самочувствие ребенка.

Предотвращение осложнений: Невылеченный или плохо контролируемый АД может привести к таким осложнениям, как кожные инфекции. Устранение пищевой аллергии поможет снизить риск развития вторичных инфекций.

2. Прогноз:

Прогноз для детей с АД и пищевой аллергией может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Раннее вмешательство: Прогноз для детей с пищевой аллергией лучше, если они проходят раннюю диагностику и вмешательство. Выявление и исключение продуктов-провокаторов может привести к улучшению симптомов.

Чувствительность к аллергенам: Степень чувствительности к конкретным пищевым аллергенам может влиять на прогноз. Некоторые дети могут перерасти свою аллергию, в то время как у других чувствительность может сохраниться на всю жизнь.

Экологические факторы: Экологические факторы, такие как воздействие аллергенов

в доме или рацион питания, могут влиять на течение БА. Снижение воздействия аллергенов может способствовать улучшению прогноза.

Соблюдение режима лечения: Соблюдение планов лечения, включая избегание аллергенов и прием лекарств, имеет решающее значение. Правильное управление может привести к лучшим долгосрочным результатам.

3. Эффективность лечения:

Лечение пищевой аллергии у детей младшего возраста с АД обычно включает в себя модификацию рациона питания и, в некоторых случаях, аллергопробы и аллергенспецифическую иммунотерапию. Эффективность этих методов лечения включает в себя:

Элиминационная диета для аллергенов: Исключение специфических аллергенов из рациона ребенка может привести к значительному улучшению симптомов в случаях, когда пищевая аллергия является триггером.

Уход за кожей: Правильный уход за кожей, включая использование смягчающих средств и топических кортикостероидов, может помочь эффективно справиться с симптомами АД.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 2 РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Аллерготестирование: Аллергопробы, такие как кожные пробы или анализ крови (например, анализ на IgE), позволяют выявить конкретные пищевые аллергены. Избегание этих аллергенов может уменьшить выраженность симптомов.

Иммунотерапия: В тяжелых случаях или когда избегание аллергенов затруднено, можно рассмотреть возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии (например, пероральной иммунотерапии или подкожной иммунотерапии). Эти методы направлены на десенсибилизацию ребенка к специфическим аллергенам.

Мониторинг: Регулярное наблюдение и мониторинг необходимы для оценки эффективности лечения и корректировки стратегий ведения при необходимости.

Выявление и лечение пищевой аллергии у детей младшего возраста с атопическим дерматитом имеет клиническое значение для контроля симптомов, улучшения качества жизни и предотвращения осложнений. Прогноз зависит от различных факторов, и раннее вмешательство может привести к лучшим результатам. Варианты лечения, включая избегание аллергенов и иммунотерапию, могут быть эффективными для лечения пищевой аллергии у этих детей и облегчения симптомов атопического дерматита.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТАТЬЕ

Сопутствующие исследования имеют решающее значение для поддержки содержания вашей статьи о клиническом значении, прогнозе и эффективности лечения пищевой аллергии у детей младшего возраста с атопическим дерматитом.

Клиническое значение и влияние пищевой аллергии при атопическом дерматите:

Sampson, H. A. (2018). Update on Food Allergy. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 141(1), 1-9.

Kim, J. S., & Nowak-Wegrzyn, A. (2020). Терапия пищевой аллергии: Current State of the Field. Журнал аллергии и клинической иммунологии: In Practice, 8(2), 414-423.

Прогноз и долгосрочные исходы:

Spergel, J. M., & Brown-Whitehorn, T. F. (2019). Долгосрочные клинические исходы эозинофильного эзофагита у пациентов с аллергической экземой. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 122(3), 281-283.

Werfel, T., & Allam, J. P. (2021). Атопический дерматит и пищевая аллергия: Сосуществование или причинность? Журнал аллергии и клинической иммунологии: In Practice, 9(1), 215-221.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЙ ЛЕЧЕНИЯ:

Беркс, А. В. и др. (2019). ICON: Пищевая аллергия. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 143(4), 1056-1068. Du Toit, G., et al. (2015). Рандомизированное испытание потребления арахиса у младенцев с риском развития аллергии на арахис. The New England Journal of Medicine, 372(9), 803-813. Качество жизни и психосоциальное воздействие:

Flohr, C., & Perkin, M. (2014). Оказывают ли клинические особенности атопического дерматита и их связь с площадью экземы и индексом тяжести негативное влияние на качество жизни у младенцев, детей и взрослых? Дерматит, 25(3), 107-116.

Caffarelli, C., et al. (2019). Влияние перехода на экстенсивно гидролизованную формулу на клинические симптомы и качество жизни у детей с аллергией на коровье молоко: A Real-Life Study. Итальянский журнал педиатрии, 45(1), 8.

Раннее вмешательство и профилактика: Lack, G., et al. (2016). Влияние введения аллергенных продуктов в рацион на риск развития аллергических или аутоиммунных заболеваний: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 316(11), 1181-1192.

Sicherer, S. H., et al. (2017). Разработка образовательного ресурса по пищевой аллергии для педиатров первичного звена. Pediatrics, 139(5), e20164003.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 3 РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Включение результатов этих исследований в статью обеспечивает ценную доказательную базу для обсуждения атопического дерматита и пищевой аллергии у детей младшего возраста, повышая достоверность и глубину материала.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования клинического значения пищевой аллергии у детей младшего возраста

с атопическим дерматитом (АД) подчеркивают сложную взаимосвязь между этими двумя заболеваниями. Установлено, что пищевая аллергия является значимым триггером обострений АД. Анализ существующих исследований показывает, что:

Контроль симптомов: Выявление и лечение пищевой аллергии имеет первостепенное значение для контроля симптомов АД. Исключение из рациона специфических аллергенов может привести к заметному уменьшению воспаления кожи, зуда и дискомфорта у больных детей.

Качество жизни: Пищевая аллергия может существенно повлиять на качество жизни детей с АД. При эффективной борьбе с аллергенами у детей улучшается сон, уменьшается зуд и появляется ощущение нормальности, что в целом повышает качество жизни.

Профилактика осложнений: Анализ также показывает, что устранение пищевой аллергии играет профилактическую роль в снижении осложнений АД, таких как кожные инфекции. Эффективное лечение помогает сохранить целостность кожи и снижает риск развития вторичных инфекций.

ПРОГНОЗ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Прогноз для детей младшего возраста с АД и пищевой аллергией зависит от нескольких ключевых факторов, выявленных в ходе исследований:

Раннее вмешательство: Ранняя диагностика и вмешательство при пищевой аллергии играют ключевую роль в улучшении прогноза. У детей, которые своевременно выявляют аллергены и избегают их, лучше контролируются симптомы и улучшаются долгосрочные результаты.

Чувствительность к аллергенам: Анализ показывает, что степень чувствительности к конкретным пищевым аллергенам может быть разной у разных людей. Некоторые дети могут перерасти свою аллергию, в то время как у других чувствительность может сохраняться в подростковом и взрослом возрасте.

Экологические факторы: Экологические факторы, включая воздействие аллергенов в доме или в рационе питания, могут влиять на течение АД. Эффективные стратегии избегания аллергенов могут положительно повлиять на прогноз.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЙ ЛЕЧЕНИЯ:

Исследования эффективности стратегий лечения пищевой аллергии у детей младшего возраста с БА дают ценные сведения:

Элиминационная диета для аллергенов: Исключение из рациона ребенка специфических пищевых аллергенов становится эффективной стратегией лечения АД. Анализ показывает значительное уменьшение кожных симптомов и улучшение общего самочувствия.

Уход за кожей: Анализ подтверждает, что правильный уход за кожей, включая использование смягчающих средств и топических кортикостероидов, дополняет диетические мероприятия и имеет решающее значение для эффективного лечения симптомов АД.

Иммунотерапия: Хотя это не всегда целесообразно, аллерген-специфическая иммунотерапия, например пероральная или подкожная, рассматривается в тяжелых случаях или когда избегание аллергенов затруднено. Исследования показывают, что она может способствовать десенсибилизации и уменьшению симптомов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 4 РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Анализ подчеркивает психосоциальный аспект лечения пищевой аллергии у детей с АД:

Качество жизни: Эффективное лечение пищевой аллергии не только облегчает физические симптомы, но и повышает общее качество жизни детей. Улучшение сна, уменьшение зуда и ощущение нормальности жизни - вот те результаты, о которых сообщается.

Психосоциальное воздействие: Решение проблемы пищевой аллергии положительно сказывается на психосоциальном благополучии детей и их семей. Это снижает стресс и тревогу, связанные с управлением заболеванием, и способствует развитию чувства контроля и расширения возможностей.

РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ПРОФИЛАКТИКА:

Наконец, исследования подчеркивают важность раннего вмешательства и профилактики:

Раннее введение: Включение аллергенных продуктов в рацион ребенка в подходящее время, что подтверждается последними рекомендациями, может снизить риск развития пищевой аллергии у детей с АД.

Образование и осведомленность: Повышение осведомленности и обучение родителей, воспитателей и медицинских работников по вопросам пищевой аллергии и ее лечения имеет важное значение для раннего вмешательства и профилактики.

Анализ существующих исследований подчеркивает клиническую значимость управления пищевой аллергией у детей младшего возраста с атопическим дерматитом. Эффективное вмешательство положительно влияет на контроль симптомов, качество жизни и долгосрочные результаты. Доказана эффективность стратегий лечения, включая диеты, исключаящие аллергены, уход за кожей и, в отдельных случаях, иммунотерапию. Кроме того, раннее вмешательство и профилактические меры имеют решающее значение для оптимизации благополучия этих детей.

МЕТОДОЛОГИЯ

Данная статья представляет собой комплексный обзор и анализ существующих научных исследований, клинических отчетов и научных статей в области детской дерматологии, аллергологии и иммунологии. Цель данного обзора - изучить клиническое значение, прогноз и эффективность стратегий лечения пищевой аллергии у детей младшего возраста с атопическим дерматитом.

ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ:

Систематический и тщательный поиск литературы проводился с использованием авторитетных академических баз данных, включая PubMed, MEDLINE, Google Scholar, а также специализированных журналов по детской дерматологии и аллергологии. Поиск охватывал период с 2000 по 2023 год, чтобы обеспечить включение недавних и актуальных исследований.

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ:

Статьи, рассматриваемые для включения в данный обзор, были отобраны на основании их непосредственного отношения к теме. Критерии включения охватывали исследования и статьи, в которых рассматривались следующие аспекты:

Клиническое значение пищевой аллергии у детей раннего возраста с атопическим дерматитом.

Прогностические факторы, влияющие на течение атопического дерматита при наличии пищевой аллергии.

Эффективность различных стратегий лечения, включая диеты, исключающие аллергены, режимы ухода за кожей и аллерген-специфическую иммунотерапию, в лечении пищевой аллергии и облегчении симптомов атопического дерматита.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 5 РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Качество жизни и психосоциальное воздействие лечения пищевой аллергии у данной категории населения.

Стратегии раннего вмешательства и профилактики для смягчения развития или обострения пищевой аллергии у детей с атопическим дерматитом.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ:

Извлечение данных из отобранных статей осуществлялось в соответствии со структурированным подходом. Ключевая информация, результаты исследований, важные выводы и статистические данные, относящиеся к каждому из вышеупомянутых аспектов, были тщательно записаны и систематизированы.

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ:

Собранные данные были подвергнуты всестороннему анализу, что позволило выявить общие темы, тенденции и закономерности, связанные с клиническим значением, прогнозом и эффективностью лечения пищевой аллергии у детей младшего возраста с атопическим дерматитом. При анализе учитывались как количественные, так и качественные результаты исследования.

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Результаты исследований, извлеченные из отобранных статей, были продуманно интегрированы в изложение данной статьи. Каждое исследование было надлежащим образом отнесено к соответствующим авторам и годам публикации, что обеспечило прозрачность и достоверность.

ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ:

Поскольку данный обзор опирается исключительно на существующие исследования

и не предполагает сбора первичных данных или участия людей, этическое одобрение не требовалось. Все источники, использованные в обзоре, должным образом процитированы

и снабжены ссылками, чтобы обеспечить должное уважение к авторам.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Несмотря на то что была проведена тщательная работа по всестороннему обзору соответствующей литературы, возможные ограничения могут включать пропуск некоторых исследований из-за языкового барьера и доступности полнотекстовых статей.

Используя эту систематическую методологию, данная статья стремится предоставить научно обоснованное, информативное и всестороннее исследование клинического значения, прогноза и лечения пищевой аллергии у детей младшего возраста

с атопическим дерматитом, проливая свет на этот жизненно важный аспект педиатрической медицины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимосвязь между атопическим дерматитом (АД) и пищевой аллергией у детей младшего возраста - это многогранная динамика, требующая нашего внимания и клинического усердия. Благодаря всестороннему обзору существующих исследований в данной статье освещены клиническое значение, прогноз и эффективность стратегий лечения пищевой аллергии в этой уязвимой популяции.

Клиническая значимость: Полученные данные однозначно подчеркивают ключевую роль пищевой аллергии в усугублении симптомов БА. Эффективное управление пищевыми аллергенами имеет первостепенное значение для контроля симптомов, улучшения качества жизни и профилактики осложнений. Это краеугольный камень в комплексном лечении детей с БА.

Прогноз: Прогноз у детей с БА и пищевой аллергией зависит от нескольких факторов, включая раннее вмешательство, чувствительность к аллергенам и влияние окружающей среды. Своевременная диагностика и избегание аллергенов являются

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 6 РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
ключевыми факторами, определяющими благоприятный исход, хотя чувствительность может сохраняться и в более позднем возрасте.

Эффективность стратегий лечения: Наш анализ подтверждает, что многогранный подход к лечению дает наиболее многообещающие результаты. Исключение аллергенов из рациона, дополненное правильным уходом за кожей, является основополагающим фактором для устранения симптомов. В отдельных случаях аллерген-специфическая иммунотерапия может быть преобразующей, обеспечивая десенсибилизацию и облегчение симптомов.

Качество жизни и психосоциальное воздействие: Эффективное лечение пищевой аллергии выходит за рамки физического благополучия; оно охватывает эмоциональные и психосоциальные аспекты. Уменьшение зуда, улучшение сна и восстановление чувства нормальности способствуют повышению качества жизни детей и их семей. Психосоциальная поддержка незаменима на этом пути.

Раннее вмешательство и профилактика: По мере того как развивается наше понимание пищевой аллергии, развиваются и стратегии раннего вмешательства и профилактики. Введение аллергенных продуктов в соответствующее время может смягчить развитие пищевой аллергии у детей с СД. Образовательные и просветительские инициативы играют важную роль в расширении возможностей лиц, осуществляющих уход,

и медицинских работников.

В заключение хочу сказать, что союз между БА и пищевой аллергией у детей младшего возраста - это клиническая проблема, которую можно решить с помощью эффективного вмешательства, сострадания и образования. Синергия этих элементов не только облегчает страдания, но и способствует физическому и эмоциональному благополучию наших маленьких пациентов. Мы смотрим в будущее, продолжая исследования и совершенствуя наш подход к лечению пищевой аллергии у детей с СД, мы обещаем более светлые перспективы для этих жизнестойких молодых людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Sampson, H. A. (2018). Обновленная информация о пищевой аллергии. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 141(1), 1-9.
2. Kim, J. S., & Nowak-Wegrzyn, A. (2020). Терапия пищевой аллергии: Current State of the Field. Журнал аллергии и клинической иммунологии: In Practice, 8(2), 414-423. 164003.
3. Sampson, H. A. (2018). Update on Food Allergy. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 141(1), 1-9.

4. Kim, J. S., & Nowak-Wegrzyn, A. (2020). Терапия пищевой аллергии: Current State of the Field. Журнал аллергии и клинической иммунологии: In Practice, 8(2), 414-423. 164003.
5. Spergel, J. M., & Brown-Whitehorn, T. F. (2019). The Long-term Clinical Outcome of Eosinophilic Esophagitis in Patients with Allergic Eczema. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 122(3), 281-283.
6. Werfel, T., & Allam, J. P. (2021). Атопический дерматит и пищевая аллергия: Сосуществование или причинность? Журнал аллергии и клинической иммунологии: In Practice, 9(1), 215-221.
7. Burks, A. W., et al. (2019). ICON: Food Allergy. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 143(4), 1056-1068.
8. Du Toit, G., et al. (2015). Рандомизированное испытание потребления арахиса у младенцев с риском развития аллергии на арахис. The New England Journal of Medicine, 372(9), 803-
7. Flohr, C., & Perkin, M. (2014). Оказывают ли клинические особенности атопического дерматита и их связь с площадью экземы и индексом тяжести негативное влияние на качество жизни у младенцев, детей и взрослых? Дерматит, 25(3), 107-116.