

BOLALARDA POLIMIYELIT KASALLIGI KELIB CHIQISHI

*Respublika o'rta tibbiyat va farmatsevt xodimlar malakasini oshirish va
ixtisoslashtirish markazi Termiz filial direktori vrach pediator
Zokir Amanovich Safarov*

*Respublika o'rta tibbiyat va farmatsevt xodimlar malakasini oshirish va
ixtisoslashtirish markazi Termiz filial o'qituvchisi farmasevt
ZayniddinovMuhiddinSalohiddinovich*

Аннотация: Осложнения симптомов полиомиелита и помощь при наблюдаемых явлениях.

Ключевые слова: Полимиелит, поливирусы, энтеровирусы, эндонуклеазы.

Annotatsiya: Polimiylit simptomlari asoratlari hamda kuzatiladigan hodisalarda yordam berish.

Kalit so'z: Polimiylit, poliviruslar, enterovirus, endonukleazalar

KIRISH:

Poliomiyelit (yun. polios — kulrang va myelos — orqa miya) — polioviruslar chaqiradigan o'tkir yuqumli kasallik. Bunda markaziy nerv sistemasi zararlanadi. Falaj bilan yoki falajsiz kechadi, ba'zi hollarda o'limga olib keladi. Poliomiyelit qadimdan ma'lum. Asosan 3-8 yoshdagi bolalar o'rtasida keng tarqalgan, ba'zan katta yoshdagilar orasida uchraydi.

POLIOMIYELITNI 3 TURGA BO'LISH MUMKIN:

• **Abortdan poliomielit:** Kasallikning eng yengil shakli, alomatlari grippga o'xshaydi va odatda ko'p hollarda azoblanadi. Bunday holda alomatlar **yuqori isitma, bezovtalik, ishtahani yo'qotish**, tomoq yoki oshqozon og'rig'i (ich qotishi)

• **Nogiron bo'limgan poliomielit:** Bunday holda, alomatlar abortiv poliomielit bilan bir xil, ammo og'irligi, yuqori isitmasi, **ko'ngil aynish, quşish, og'ir bosh og'rig'i**. Bundan tashqari, bir necha kundan keyin bolada bo'yin yoki umurtqa pog'onasi qattiqlashishi, bo'yin, ekstremitalar va orqa mushaklar og'rig'i paydo bo'lishi mumkin.

• **Poliomielit kasalligi:** Bu kasallikning eng jiddiy bosqichi. Semptomlar poliomiyelitning ikkita yengil turidagi kabi, ammo ba'zi juda jiddiyatlari qo'shiladi. Qattiq konstipatsiya, **tanadagi mushaklarning kuchsizligi, nafas qisilishi** va yutish, yo'tal, teri dog'lari, yo'qotish sifinkterni boshqarish, neyronal falajning boshqa odatiy belgilari qatorida tomoq yoki shishiradi.

EPIDEMIOLOGIYASI

Virusni sun'iy ko'paytirish usulining kashf etilishi, poliomiyelitga qarshi vaksina yaratilishi va bolalarni yoppasiga emlash amalga oshirilishi tufayli kasallik tez kamaydi. Kasallikni qo'zg'atuvchi viruslar suvda uzoq, vaqt saqlanadi, qaynatilganda, kaliy

permanganat va vodorod peroksid ta'sirida halok bo'ladi. Kasallik bemor bilan yoki kasallik qo'zg'atuvchisini tashib yuruvchilar bilan muloqotda bo'lganda yuqadi. Virus havo-tomchi yo'llari orqali shuningdek, ifloslangan sabzavot, meva, qaynatilmagan suv, sutni iste'mol qilganda organizmga o'tadi. Yoz va kuz oylarida poliomiyelit ko'proq uchraydi. Inkubation davri 7-14 kun.

ETIOLOGIYASI:

Qo'zgatuvchisi: kattaligi 30 Nanometer bo'lgankapsulasiz, RNK tutuvchi poliovirusdir. Bu virus Picornoviridae oilasiga mansub bo'lgan Enterovirusdir. Polioviruslarning uchta serotipi mavjud:

- Brunhilde
- Lansing
- Leon

Bu uchta tip o'zidan so'ng alohida immunitet qoldiradi.

PATOGENEZI:

Virus og'iz orqali ichaklarga boradi. U yerda ko'payib lokal limfa tugunlarini zararlaydi. Limfa tugunlarida ham ko'payib, gonga o'tadi (viremiya). Qon aylanish yo'lli bilan orqa miyaga boradi, orqa miya kulrang moddasini zararlaydi. Orqa miya motoneyronlarini shikastlab, ko'ndalang — targ'il muskullar faoliyatini chegaralaydi. Orqa miyaga esa immun himoya reaksiyasi natijasida leykositlar to'planib yallig'lanishni hosil qiladi. Bu yallig'lanish natijasida orqa miya nerv hujayralari faoliyati buziladi. Natijada falajlik yuzaga keladi

Simptomlari:

Xastalikning yashirin davri va ilk belgilari ham bo'lib, yashirin davri virus yuqtirilgan kundan boshlab 21 kungacha cho'zilishi mumkin. Kasallik o'tkir boshlanadi: bemorning temperaturasi 38—39° gacha ko'tariladi, yo'tal, aksirish, tomoq og'rishi, qorinda og'riq paydo bo'lishi va ich ketishi kuzatiladi. Bu belgilar 4—5 kundan keyin o'tib ketadi, bir haftadan so'ng temperatura yana ko'tariladi va turli muskullar, ayniqsa, oyoq va qo'llar falaji avj oladi.

Falajsiz poliomiyelit yuqori nafas yo'llarining o'tkir katari sifatida yoki me'da-ichak faoliyatining buzilishi ko'rinishida kechadi.

KLINIKASI:

Bemor kasalxonada davolanadi. Falaj bilan kechadigan poliomiyelitda zararlangan qo'l va oyoqning harakatlanishi buziladi, kasal qo'l yoki oyoq sog'lom oyoq-qo'lga qaraganda o'sishdan orqada qoladi. Shu sababli kompleks davolashda massaj, davo fizkulturası, oyoq va qo'llar uchun maxsus ortopedik apparatlar, tana va bo'yinga korset taqish tavsiya etiladi. Keyinchalik sanatoriyl-kurortda davolanish kerak. Falaj bilan kechadigan poliomiyelit uzoq va to'g'ri davolanganda oyoq va qo'llarning izdan chiqqan funksiyalari tiklanishi mumkin.

OLDINI OLISH:



Vaktsina: Poliomiyelitning samaradorligi 90% dan yuqori, chunki u 50-yillarda kasallikning jiddiy tarqalishidan keyin Ispaniyada tarqatila boshlandi, poliomiyelit deyarli butunlay yo'q qilindi. Biroq, yuqtirishning turli shakllari mavjud, shuning uchun har qanday holatda ham qo'riqchini tushirmslik kerak.

Hulosa: **Vaksina asosiy profilaktika chorasi hisoblanadi**, shuning uchun siz farzandlaringizning vaktsinalarini zamonaviyligini tekshirishingiz kerak.

Foydalanimaganabiyotlar:

Чумаков М. П., Присман И. М., Зацепив Т. О., Полиомиелит — детский спинномозговой паралич, М., 1953;

Эпидемический полиомиелит, М., 1957;

Полиомиелит, пер. с англ., М., 1957;

Дроздов С. Г., Полиомиелит и его профилактика в различных странах мира, М., 1967.

O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil